

NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 augustus 1986.

1. Augustus en september zijn een zeer goede periode voor het observeren van roofvogels en steltlopers op trek. Heel vaak betreft het broedvogels uit het hoge Noorden, die langs West-Europa doortrekken naar hun overwinteringsgebieden die soms ver in Afrika gelegen zijn. Voor onze streken noemt men ze dan ook "doortrekkers".

Gedurende de geleide wandeling van 21 augustus 11. zagen we niet minder dan 5 bruine kiekendieven en op 24 augustus zelfs 7 torenvalken. Deze twee soorten roofvogels kan men trouwens dagelijks observeren in en bij het reservaat. Ook de blauwe kiekendief, de buizerd, de wespndief en de boomvalk zijn trouwens helemaal geen zeldzaamheden in deze periode van het jaar.

Op 27 juli was er bijzonder veel trek van steltlopers. We noteerde ongeveer 800 tureluurs, een zestigtal groenpootruiters en 15 zwarte ruiters. Op 3 augustus was er ook één exemplaar poelruiter in het Zwin.

Van 27 tot 31 juli observeerden we een blonde ruiter. Dit betreft een Noord-Amerikaanse broedvogel die uitzonderlijk in West-Europa wordt waargenomen. Dit betreft de tweede waarneming voor ons land.

Bijna dagelijks ziet men in het schorregebied ook krombekstrandlopers. Dit is een kleine steltloper die soms buitengewone trek-verplaatsingen onderneemt. Ze broeden in het uiterste N. en N.O. van Siberië, vanaf de Jenissei (82° O) tot aan de Kolymarivier (164° O). Ze brengen de winter door tot in Zuid-Afrika ; soms trekken ze door naar N. of Z.Amerika. Vijftien dagen nadat we een exemplaar nabij het Zwin geringd hadden werd hij teruggevangen op het eiland Barbados (voor de kust van Venezuela - Midden-Amerika).

2. Eveneens in deze periode ziet men omzeggens dagelijks lepelaars in het reservaat. Op 21 augustus waren er zelfs 24 exemplaren. Dit zijn grote witte steltlopers, waarvan Nederland de meest noordelijke broedplaatsen van Europa heeft : Texel, Terschelling, Oostvaardersplassen, het Naardermeer en het Zwanewater. Deze vogels hebben hun overwinteringsplaatsen van Noord-Afrika tot Mauretanië. Schorregebieden zijn hun geliefkoosd biotoop. Met hun lepelvormige snavel maaien ze uit de slikken en ondiepe plassen allerlei kleine slakjes, wormpjes, visjes enz.op.
3. Op de yisrijke vijvers tussen de dijk van het vogelpark en de duinen zijn er steeds fuutachtigen aanwezig, vooral de gewone fuut en de dodaars ; sedert 21 augustusechter ook twee geoorde futen.

De Conservator,
Guido Burggraeve.